



Beklometason

Beklometason er et kortisonlignende stoff som hindrer at slimhinnen i lufttrøret blir rød og hoven og lager slim. Det kan gå fra et par dager til et par uker før du kjenner at medisinen hjelper.

Beklometason forebygger astmasymptomer.

Ulike varianter av medisinen

Inhalasjonsspray: AeroBec® 50 og 100 mikrogram/dose.

Autohaler: AeroBec® 50 og 100 mikrogram/dose.

Inhalasjonspulver:

Beclomet Easyhaler® 200 mikrogram/dose.

Hvordan medisinen skal tas

Legen bestemmer hvor ofte og hvor mye du skal ta av medisinen. Beklometason skal tas regelmessig. En eller to ganger daglig er det vanlige. Be legen din om behandlingsskjema for astma. Da vet du når du skal trappe opp og ned medisinen som for eksempel ved infeksjoner eller i pollensesongen.

- Inhalasjonssprøyen skal alltid tas gjennom kammer
- Autohaler krever lang, rolig innpust.

De viktigste bivirkningene

- Bivirkninger er sjeldne. Noen få kan bli hese, få sopp i munn og svelg, og rundt munnen ved bruk av maske. Derfor skal du alltid skylle munnen etterpå.
- Enkelte kan oppleve uro.
- Kortison er et livsviktig hormon, som lages i binyrene. I sjeldne tilfeller kan noen få problemer med at kroppen slutter å lage kortison selv. Da har man brukt veldig høye doser over lang tid. Derfor skal du ikke slutte å ta medisinen på egen hånd. Beklometason skal trappes ned i samarbeid med lege, slik at kroppen får tid til å lage mer kortison selv.
- Noen få kan også i en periode vokse noe saktere når de bruker mye kortison over lang tid.

Kontakt lege

- Dersom du får allergisk reaksjon som akutt tung pust, hoven i ansikt, elveblest eller besvimelse.
- Dersom bivirkningene er plagsomme, og ikke går over.
- Ved ukjente symptomer som oppstår underveis og vedvarer.
- Ved graviditet.

Praktiske opplysninger

Oppbevaring og holdbarhet:

Inhalasjonsspray og Autohaler: Skal oppbevares i romtemperatur. Unngå direkte sollys og varme.

Inhalasjonspulver: Beclomet Easyhaler® skal oppbevares i romtemperatur, når foliepakken er åpnet er holdbarheten redusert til kun 6 måneder.

Resept: AeroBec® og Beclomet® får du på blå resept. Følg med på telleverket hvor mange doser du har igjen.

Annet: Effekten av beklometason kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med andre medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd.

For generelle råd om medisinbruk, se www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv.