



Bosentan

Bosentan utvider blodårene som fører blod fra hjertet til lungene (lungearteriene). Dette reduserer motstanden og lungeblodtrykket, og gjør hjertets pumpearbeid lettere.

Ulike varianter av medisinen

- Filmrasjerte tabletter:** Bosentan 62,5 mg og 125 mg
Stayveer® 62,5 mg og 125 mg
Tracleer® 62,5 mg og 125 mg
- Kapsler:** Bosentan kapsler produseres i tilpassede styrker ved Sykehusapotekene Oslo.
- Mikstur:** Finnes ikke. Tabletter, ev. innhold i kapsler, løses opp i vann, se utblanding under.

Hvordan medisinen skal tas

Dosering: Bosentan tas 2 ganger daglig (morgen og kveld). Vanlig dose er 2-4 mg/kg morgen og kveld, med halv dose som oppstart første måned. Det å slutte brått med bosentan kan forverre symptomene, dersom barnet skal slutte med medisinen gjøres dette i samråd med lege.

Utblanding: Tabletten, eller innholdet i en kapsel, kan løses i vann etter følgende fremgangsmåte:

1. Legg en hel eller halv tablett i en sprøyte avhengig av dosen som skal gis. Ved mindre doser enn en halv tablett, se under.
2. Trekk opp minimum 5 ml vann i sprøyten
3. Snu sprøyten frem og tilbake til alt er jevnt fordelt
NB! Tabletten løser seg raskt, men alt pulver vil ikke løse seg
4. Gi dosen umiddelbart etter utblanding

Ved mindre doser enn en halv tablett kan sykehusapoteket lage kapsler med riktig dose. Innholdet i disse kan løses i vann, som beskrevet over. Kontakt lokalt sykehusapotek for å bestilling m. v.

NB! Gravide skal ikke blande ut bosentan da virkestoffet kan være fosterskadelig. Ved deling av tabletter dannes det derimot lite legemiddelstøv, og gravide kan med beskyttende munnbind og hansker utføre dette om nødvendig.

Til måltider eller ikke: Kan tas med eller uten mat.

De viktigste bivirkningene

Den viktigste bivirkningen er påvirkning av leverfunksjonen, og dette kontrolleres regelmessig med blodprøver. Hodepine, nesetetthet, rødming i huden og tendens til væskeopphopning i kroppen forekommer. Disse er ufarlige og går vanligvis raskt over. Mer sjeldne bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget.

Kontakt lege dersom

- du har vedvarende problemer med medisinerings av barnet ditt
- barnet har fått for mye bosentan
- du mistenker bivirkninger

Praktiske opplysninger

Oppbevaring og holdbarhet: Bosentan tabletter og kapsler oppbevares ved romtemperatur, på et tørt sted. Holdbarheten er angitt på pakningen.

Resept: Bosentan (Stayveer, Tracleer) fås på H-resept. Dette betyr at du slipper å betale for medisinen, utgiftene blir dekket av ditt regionale helseforetak (RHF). Vær oppmerksom på at leveringstid for spesiallagde kapsler er noe lengre enn for tablettene.

Kontroller: Det er nødvendig med regelmessige blodprøver for å kontrollere leverfunksjonen.

Annet: Effekten av bosentan kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Lege må vurdere om legemidler som barnet trenger kan kombineres med bosentan. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd du gir barnet. Hormonell prevensjon (p-piller) er ikke sikker ved samtidig inntak av bosentan fordi det reduserer effekten av p-piller. Annen sikker prevensjon (for eksempel kondom) må derfor benyttes. I tilfeller der ungdom slutter med bosentan, må sikker prevensjon brukes i inntil tre måneder etter avsluttet behandling.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner se:

www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv/