



Flekainid

Flekainid bremser den elektriske ledningshastigheten i hjertet og brukes til behandling av forstyrrelser i hjerterytmen.

Ulike varianter av medisinen

Mikstur: Flekainid SA 5 mg/ml og 10 mg/ml

Tabletter: Tablettene finnes i to ulike varianter:

Vanlige tabletter som frigir all medisin med en gang og varer over kortere tid, og depotkapsler som frigir medisinen gradvis over ett døgn.

Vanlige tabletter:	Flekainid Sandoz 100 mg Tambocor 100 mg
Depotkapsler:	Tambocor Retard 200 mg

Hvordan medisinen skal tas

Dosering: Flekainid gis 2-3 ganger daglig, vanlig dose er 1-5 mg/kg per døgn (maks 8 mg/kg/døgn). Depotkapslene tas vanligvis 1 gang pr dag. Dosen økes som oftest gradvis inntil ønsket effekt. Hvis behandlingen skal avsluttes, bør det skje over tid og i samråd med lege.

Utblanding: Bruk ferdig mikstur. Ryst miksturen før bruk.

Til måltider eller ikke: Melkeprodukter kan redusere opptaket, og bør ikke inntas samtidig med medisinen.

De viktigste bivirkningene

Svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine og mageproblemer er rapportert, men plagsomme bivirkninger er uvanlige. Hos barn dreier det seg i hovedsak om såkalt generelle bivirkninger som kan opptre ved all medisiner. En sjelden gang kan barnets rytmeproblemer forverres på grunn av utilsiktede effekter.

Mer sjeldne bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget for tablettene. Dersom barnet ditt får mikstur kan du finne informasjon om bivirkninger ved å søke på www.felleskatalogen.no og lese under pasientinformasjon om tablettene nevnt i dette skrivet.

Kontakt lege dersom

- du har vedvarende problemer med medisiner av barnet ditt
- barnet har fått for mye flekainid
- du mistenker bivirkninger

Praktiske opplysninger

Oppbevaring og holdbarhet: Flekainid tabletter og mikstur skal oppbevares i romtemperatur, på et tørt sted. Holdbarheten er angitt på pakningen.

Resept: Flekainid (Tambocor) tabletter fås på blå resept. Miksturen fås ikke automatisk på blå resept, men legen vil søke Helfo om godkjenning. Sykehusapoteket ved det sykehuset behandlingen har startet kan levere ut for en måneds forbruk på blå resept, mens søknaden er til behandling.

Miksturen er ikke vanlig lagervare på lokalapotek. Hent miksturen på sykehusapoteket før utskrivning og ta kontakt med ditt lokalapotek i god tid før du går tom, slik at de kan bestille den for deg.

Kontroller: Hjerterytme og blodtrykk vil blant annet bli kontrollert. I noen tilfeller er det aktuelt å måle konsentrasjonen av legemidlet i blodet.

Annet: Effekten av flekainid kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med andre medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd du gir barnet.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner, se: www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv

Revidert 2021, versjon 2.

Informasjonen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Legemidler kan bli brukt på ulik måte hos ulike pasienter. Skrivene er derfor veiledende og det er viktig at du kontakter lege eller apotek ved usikkerhet om barnets legemiddelbruk. Tilbakemeldinger på innholdet i disse brosjyrene kan rettes til redaksjonskomiteen i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, post@legemidlertilbarn.no.