



# Furosemid

*Furosemid er en såkalt vanddrivende medisin som bl.a. brukes ved høyt blodtrykk og hjertesvikt. Den fører til at nyrene skiller ut mer salter og væske, og senker dermed blodtrykket. Det minsker blant annet symptomer som væskeopphopning i kroppen og tung pust, og letter hjertets pumpearbeid.*

## Ulike varianter av medisinen

<b>Mikstur:</b>	Diural dråper 10 mg/ml
	Frusol 10 mg/ml
	Impugan dråper 10 mg/ml
	Lasix liquidum 10 mg/ml

**Tabletter:** Tablettene finnes i 2 ulike varianter:

Vanlige tabletter som frigir all medisin med en gang og varer over kortere tid og depotkapsler som frigir medisinen gradvis over ett døgn.

<b>Tabletter:</b>	Furix 20 mg, 40 mg og 500mg,
	Furosemid 20 mg, 40 mg og 500 mg
<b>Depotkapsler:</b>	Furix Retard 30 mg
	Lasix Retard 30 mg og 60 mg

## Hvordan medisinen skal tas

**Dosering:** Vanlige furosemid tabletter gis vanligvis 2-3 ganger daglig. Medisinen virker etter ca. 30 minutter og varer i ca. 5 timer. Vanlig dose er 0,5-1 mg/kg. Depotkapslene tas vanligvis 1 gang pr dag.

**Utblending:** Bruk ferdig mikstur. Tabletter tas hele eller kan knuses og blandes med vann ved behov. Depotkapslene kan åpnes, men innholdet må ikke knuses eller tygges.

**Til måltider eller ikke:** Kan tas med eller uten mat, men mat forsinker opptaket noe.

## De viktigste bivirkningene

Barnet må oftere tisse forholdsvis raskt etter at medisinen er gitt. Det anbefales derfor å være i nærhet av et toalett når medisinen skal tas og ikke ta medisinen for sent på kvelden for å unngå at barnet må stå opp og tisse.

Plagsomme bivirkninger er uvanlige, men tendens til svimmelhet og slapphet forekommer, spesielt ved høye doser.

Når urinutskillelsen øker, vil kroppen samtidig miste mer salter og mineraler, spesielt kalium. Mange trenger derfor tilskudd av dette parallelt med furosemidbehandlingen. Dette skriver legen resept på hvis det blir behov for det.

Mer sjeldne bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget.

## Kontakt lege dersom

- barnet har feber, svetter mer enn vanlig eller har oppkast og diaré. Dette er tilstander som gir ekstra væsketap og det kan være aktuelt å redusere medisindosen midlertidig. Tegn på dette kan være flere tørre bleier etter hverandre eller at barnet begynner å tisse svært sjelden
- du har vedvarende problemer med medisinerings av barnet ditt
- barnet har fått for mye furosemid
- du mistenker bivirkninger

## Praktiske opplysninger

**Oppbevaring og holdbarhet:** Furosemid tabletter og mikstur skal oppbevares i romtemperatur, på et tørt sted.

Holdbarheten er angitt på pakningen.

**Resept:** Furosemid fås på blå resept. Miksturene Frusol, Impugan og Lasix fås på godkjenningsfritak og legen må søke om å få dekket disse på blåresept. Disse miksturene brukes når Diural dråper ikke kan skaffes.

**Kontroller:** Effekten av behandlingen blir fulgt opp ved legekontrollene. Det er vanlig å ta blodprøver for å kontrollere nivået av salter, spesielt kalium.

**Annet:** Effekten av furosemid kan endres av en rekke legemidler. Gjør helsepersonell oppmerksom på at barnet får furosemid ved oppstart av nye medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd du gir barnet.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner, se:

[www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv](http://www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv)