



Kaptopril

Kaptopril er en såkalt ACE-hemmer som brukes mot høyt blodtrykk og hjertesvikt. Den demper stresshormonenes effekt på hjertet og nedsetter motstanden mot blodets gjennomstrømning i kroppen, slik at hjertets pumpearbeid blir lettere.

Ulike varianter av medisinen

Mikstur: Kaptopril SA 1 mg/ml og 5 mg/ml

Tabletter: Captopril 25 mg og 50 mg

Hvordan medisinen skal tas

Dosering: Man starter vanligvis med en lav dose og øker gradvis over noen dager.

Vanlig vedlikeholdsdose er ca. 1 mg/kg 3 ganger daglig.

Utblanding: Bruk ferdig mikstur. Tabletter kan knuses og løses opp i vann ved behov.

Til måltider eller ikke: Kan tas med eller uten mat, men bør i hovedsak tas likt hver gang for å oppnå likt opptak av medisinen.

De viktigste bivirkningene

Kaptopril er et trygt legemiddel som har vært i bruk i flere tiår. Den viktigste bivirkningen er at effekten kan bli for kraftig i oppstartsfasen, noe som medfører tendens til lavt blodtrykk og iblant også redusert nyrefunksjon. Vanligvis går det over av seg selv, men unntaksvis kan denne effekten bli så kraftig at man må avbryte behandlingen. Enkelte barn kan være plaget med kløende tørrhoste, utslett og tap av smakssans. Mer sjeldne bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget. Dersom barnet ditt får mikstur kan du finne informasjon om bivirkninger ved å søke på www.felleskatalogen.no og lese under pasientinformasjon om tablettene nevnt i dette skrevet.

Kontakt lege dersom

- du har vedvarende problemer med medisinerings av barnet ditt
- barnet har fått for mye kaptopril
- du mistenker bivirkninger

Praktiske opplysninger

Oppbevaring og holdbarhet: Kaptopril tabletter og mikstur skal oppbevares i romtemperatur, på et tørt sted. Holdbarheten på tablettene er angitt på pakningen. Miksturen er holdbar i 1 måned etter at den er åpnet, men ikke lenger enn holdbarheten angitt på flasken.

Resept: Kaptopril tabletter fås på blå resept. Miksturen fås ikke automatisk på blå resept, men legen vil søke Helfo om godkjenning. Sykehusapoteket ved det sykehuset behandlingen har startet kan levere ut for en måneds forbruk på blå resept, mens søknaden er til behandling.

Kontroller: De første dagene etter oppstart og doseøkning er det aktuelt med kontroll av blodtrykk og blodprøver. Noen ganger, særlig hos små barn, velger man å starte behandlingen på sykehus.

Annet: Effekten av kaptopril kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med andre medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd du gir barnet.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner se:

www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv