



Mometasonfuroat

Mometason er et kortisonlignende stoff som hindrer at slimhinnen i nesen blir rød, hoven og lager slim. Virkning etter ca. 12 timer. Full effekt først etter et par dager.

Ulike varianter av medisinen

Nesespray: Nasonex® 50 mikrogram/ dose.

Hvordan medisinen skal tas

Følg alltid legens instruksjon om hvor mye og når medisin skal tas. Det er viktig at medisinen dusjes mot den myke delen av neseboret, bort fra neseskillevæggen.

Flasken skal allrid ristes før bruk for å sikre rett dose.

Når flasken tas i bruk for første gang må den klargjøres, dette gjøres ved å spraye ut i luften til dusjen er jevn (vanligvis ca. 10 trykk). Dersom spraypumpen ikke har vært brukt på 14 dager eller mer, er det nødvendig med 2 trykk for igjen å få en jevn dusj.

De viktigste bivirkningene

Svært vanlig:

- Lett til moderat neseblødning

Vanlig:

- Sårhet/ sårdannelse i slimhinnen
- Sårhet i halsen

Sjeldne:

- Hodepine.

Det er lurt å tilføre ekstra saltvann, 9 mg/ml, som spray eller skylling, ca. 10 minutter etter Nasonex. Det styrker og renser slimhinnen.

Kontakt lege

- Dersom medisinen ikke har virket etter 5-6 uker.
- Dersom ukjente symptomer oppstår underveis og vedvarer.

Praktiske opplysninger

Oppbevaring og holdbarhet: Nasonex® må ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Er holdbar inntil 2 måneder etter åpning.

Resept: Nasonex® kan du få på blå resept.

Annet: Effekten av mometasonfuroat kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med andre medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd.

For generelle råd om medisinbruk, se www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv.