



Propranolol

Propranolol demper stresshormonenes effekt på hjertet. Ønsket virkning er langsommere hjerterytme, blodtrykkssenkning og/eller lettet pumpearbeid for hjertet.

Ulike varianter av medisinen

Mikstur: Finnes i ulike styrker.

Tabletter: Tablettene finnes i 2 ulike varianter:

En type som frigir all medisin med en gang og varer kortere og depotkapsler som frigir medisinen gradvis over ett døgn.

Pranolol® 20 mg, 40 mg og 80 mg tabletter

Inderal® depotkapsler 80 mg og 160 mg

Hvordan medisinen skal tas

Dosering: Propranolol gis vanligvis 3 ganger daglig.

Depotkapsel gis en gang daglig. Det er meget stor variasjon i dosene avhengig av hvilken sykdom som behandles.

Dosen økes vanligvis gradvis inntil ønsket effekt. Hvis behandlingen skal avsluttes, bør det skje over tid og i samråd med lege.

Utblanding: Bruk ferdig mikstur.

Depotkapsler kan åpnes, men innholdet må ikke knuses eller tygges.

Til måltider eller ikke: Kan tas med eller uten mat.

Propranolol brukes vanligvis for å bremse hjerteaktiviteten, og i noen tilfeller kan dette medføre nedsatt fysisk yteevne, spesielt ved intense aktiviteter.

Tendens til svimmelhet og kalde hender og føtter forekommer, og noen barn opplever hyppigere mareritt.

Bivirkningene er vanligvis forbigående. Mer sjeldne bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget. Dersom barnet ditt får mikstur kan du finne informasjon om bivirkninger ved å søke på www.felleskatalogen.no og lese under pasientinformasjon om tablettene nevnt i dette skrevet.

Kontakt lege:

- Dersom du har vedvarende problemer med medisinerings av barnet ditt.
- Dersom barnet har fått for mye propranolol
- Dersom du mistenker bivirkninger

Praktiske opplysninger:

Oppbevaring og holdbarhet: Propranolol tabletter skal oppbevares i romtemperatur, på et tørt sted. En del miksturer skal oppbevares i kjøleskap. Se merking på flasken for om dette er aktuelt for miksturen barnet ditt har fått. Holdbarheten er angitt på pakningen.

Resept: Propranolol tabletter fås på blå resept. Miksturen fås ikke automatisk på blå resept, men legen vil søke Helfo om godkjenning. Sykehusapoteket ved det sykehuset behandlingen har startet kan levere ut for en måneds forbruk på blå resept, mens søknaden er til behandling.

Miksturen er ikke vanlig lagervare på lokalapotek. Hent miksturen på sykehusapoteket før utskriving og ta kontakt med ditt lokalapotek i god tid før du går tom, slik at de kan bestille den for deg.

Kontroller: Hjerterytme og blodtrykk vil bli kontrollert ved legebesøkene, og noen ganger gjøres 24-timers registrering av hjerterytmen eller fysisk belastningstest for å vurdere behandlingseffekten.

Annet: Effekten av propranolol kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med andre medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd du gir barnet.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner, se www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv.