



Sildenafil

Sildenafil utvider blodårene som fører blod fra hjertet til lungene (lungearteriene). Dette reduserer motstanden og lungeblodtrykket og gjør det hjertets pumpearbeid lettere.

Ulike varianter av medisinen

Mikstur: Revatio® 10 mg/ml (druesmak)

Tabletter: Revatio® 20 mg, Viagra® 25, 50 og 100 mg

Hvordan medisinen skal tas

Dosering: Sildenafil gis 3-4 ganger daglig. Dosen økes vanligvis gradvis over noen dager inntil ønsket effekt. Det kan ta flere uker før barnet får full effekt av legemidlet. Vanlig vedlikeholdsdose er 0,5-1 mg/kg/dose.

Utblanding: Bruk ferdig mikstur. Ryst miksturen før bruk.

Til måltider eller ikke: Kan tas med eller uten mat. Tabletten kan knuses.

De viktigste bivirkningene:

Plagsomme bivirkninger er uvanlige. Enkelte barn får tendens til lavt blodtrykk ved oppstart, noe som kan vise seg ved svimmelhet. Øket ereksjonstendens hos gutter forekommer, og noen barn får også en tendens til rødming/blussing i huden som følge av bedret hudsirkulasjon. Videre forekommer nesetetthet og mageplager, særlig løs eller hyppig avføring. Mer sjeldne bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget. Dersom barnet ditt får mikstur kan du finne informasjon om bivirkninger ved å søke på www.felleskatalogen.no og lese under pasientinformasjon om tablettene nevnt i dette skrivet.

Kontakt lege:

- Dersom du har vedvarende problemer med medisinerer av barnet ditt.
- Dersom barnet har fått for mye sildenafil
- Dersom du mistenker bivirkninger
- Dersom barnet får ereksjon som vedvarer flere timer og/eller blir smertefull

Praktiske opplysninger:

Oppbevaring og holdbarhet: Sildenafil tabletter skal oppbevares i romtemperatur og er holdbar til utløpsdato angitt på pakken. Miksturen kan enten oppbevares i romtemperatur eller i kjøleskapet. Holdbarheten er 1 mnd.

Resept: Sildenafil tabletter fås på blå resept. Miksturen fås ikke automatisk på blå resept, men legen vil søke Helfo om godkjenning. Sykehusapoteket ved det sykehuset behandlingen har startet kan levere ut for en måneds forbruk på blå resept, mens søknaden er til behandling.

Kontroller: Det er ingen spesielle medikamentkontroller, men effekten av behandlingen vurderes ved legebesøkene.

Annet: Effekten av sildenafil kan påvirkes av andre legemidler, og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med andre medisiner. Det gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler/kosttilskudd du gir barnet.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner, se www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv.