



Trimetoprim Sulfametoksazol

Trimetoprim sulfa (Bactrim®) er en antibakteriell medisin som inneholder to virkestoffer som dreper bakterier. Den brukes primært for å behandle/forebygge urinveisinfeksjon, men også av transplanterte pasienter for å forebygge en spesiell type lungebetennelse (pneumocystis) som denne pasientgruppen er utsatt for pga nedsatt immunsystem. De seks første månedene etter transplantasjonen er risikoen for denne infeksjonen størst og man bruker da Bactrim for å forebygge dette.

Ulike varianter av medisinen

Mikstur: Bactrim® (8 mg Trimetoprim/40 mg sulfa per ml).

Tabletter: Bactrim® (80 mg Trimetoprim/400 mg sulfa).

Hvordan medisinen skal tas

Dosering: Bactrim tas en gang daglig, vanligvis om morgenen.

Utblanding: Finnes som ferdig mikstur. Bruk medisinmål for dosering.

Til måltider eller ikke: Kan tas med eller uten mat.

De viktigste bivirkningene

Plagsomme bivirkninger er uvanlige, spesielt ved forebyggende behandling hvor dosen er lav, og barnet ditt trenger ikke å oppleve noen av disse.

Kontakt lege

- Dersom du har vedvarende problemer med medisinerer av barnet ditt.
- Dersom barnet har fått for mye Bactrim.
- Dersom du mistenker bivirkninger.

Praktiske opplysninger

Oppbevaring og holdbarhet: Bactrim tabletter og mikstur oppbevares ved romtemperatur, på et tørt sted. Holdbarheten er angitt på pakningen.

Resept: Bactrim fås på blå resept.

Annet: Effekten av Bactrim kan påvirkes av andre legemidler, naturlegemidler og kosttilskudd og noen kombinasjoner frarådes. Dette bør vurderes før man starter med slikt.

For generelle råd når barnet skal ta medisiner, se www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv.