

1. Endringer siden forrige versjon

- Det er 19 nye legemidler på listen: Atozet, Briviact, Cicloserina, Cortiment, Cyproheptadine, Entresto, Ezetimibe, Fampyra, Fenofibrate, Lamprene, Lorazepam, Medrol, Melatonin, Molipaxin, Peritol, Prednisolone, Rimactan, Trilafon og Voltarol.
- Ett legemiddel har fått endret konklusjon: Revolade.
- 4 navneendringer: Buprenorphine, Buspirone, Dexametason og Quetiapine depottabletter.
- Lagt inn firmanavn i parentes på alle legemidlene.
- Det er gjort noen få endringer i prosedyreteksten, om vannkvalitet og noen språkendringer.
- Det er ikke gjort en fullstendig revidering av listen.

2. Hensikt og omfang

- Sikre forsvarlig manipulering av perorale legemidler, mtp. å lette svelging av hele doser hos pasient innlagt på sykehus.
- Knuse-/delelisten er ikke tiltenkt som et verktøy for å undersøke om legemidler kan gis i sonde, se [Legemidler i sonde](#), eller som deldoser se [MAMBA](#) (Manipulering av medisiner til barn).
- Knuse-/delelisten må **ikke** brukes uavhengig av denne retningslinjen, og **må** leses før listen tas i bruk.
- Anbefalinger angående legemiddelhåndtering hos gravide er ikke utført i samme omfang som vurderingen av manipuleringen av legemidlet. Disse rådene kan anses som generelle med bakgrunn i NIOSH sine lister ([National Institute for Occupational Safety and Health](#)). For endelig beslutning om praksis på ulike avdelinger henvises det til enhets-/avdelingsleder.

3. Ansvar

- Seksjonsleder/enhetsleder er ansvarlig for at personalet gjøres kjent med retningslinjen og har tilstrekkelig med kompetanse.
- Lege som ordinerer legemiddel som må knuses/deles eller lignende skal forvise seg om at dette er i hht. godkjent preparatomtale, knuse-/delelisten, eller lignende kvalitetssikret informasjon.
- Sykepleier som manipulerer legemidler har ansvar for innhenting av opplysninger fra tilsvarende kilder dersom lege ikke spesifikt har ordinert at legemidlet skal gis på denne måten.

4. Fremgangsmåte

Dersom ikke annet er oppgitt, skal alle tabletter og kapsler svelges hele med 1/2 glass væske, fortrinnsvis vann. Undersøk først om det finnes andre administrasjonsformer av legemidlet (for eksempel mikstur, dråper til peroral bruk, brusetabletter), som pasienten kan bruke ved svelgevansker. Lege må ordinere riktig formulering. For barn gjelder [Legemidler til barn 0-18 år. Bytteliste for perorale legemidler](#). Hvis bytte av administrasjonsform ikke kan utføres, undersøk følgende:

1. Se i knuse-/delelisten for å vite hvordan legemidlet skal manipuleres. Kommer du ikke i mål med knuse-/delelisten, kontakt farmasøyt på apoteket.
2. Hent frem riktig utstyr (tablettdele og/eller tablettknuser), og evt. verneutstyr.
3. Utfør håndhygiene i hht. [Håndhygiene](#).
4. Gjennomfør manipuleringen av legemidlet vha. riktig utstyr på medisinrommet. Legemidler merket med OBS i knuse-/delelisten anbefales å manipulere i avtrekksskap/sikkerhetsbenk
 - Skal tablett røres ut i vann, anbefales det å løse den direkte opp i medisinbegeret eller den perorale sprøyten som skal gis pasienten.
 - For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset/medisinbegeret/perorale sprøyten med vann og administrere også denne væsken.
 - Valg av vannkvalitet i forbindelse med administrering av manipulerede tabletter/kapsler må vurderes lokalt utifra den enkelte enhet og pasientens sykdomstilstand.
5. Alle delene av tablettknuseren og tablettdeleteren skal rengjøres grundig etter klargjøring til hver enkelt pasient. Det er viktig at redskapene er tørre før de brukes.

Forholdsregler

- Det er ikke tatt hensyn til om legemidlet må beskyttes mot lys eller fuktighet, da bruk av knuse-/delelisten forutsetter at manipuleringen skal skje umiddelbart før utdeling. Det vil da være minimal risiko for degradering av legemidlet.
- De fleste tabletter/kapsler vil smake vondt når legemidlet knuses eller åpnes, og dette er ikke spesifisert i listen.
- I noen tilfeller der knuse-/delelisten angir at legemidlet kan knuses/deles/åpnes tas det forbehold om at dette kan påvirke legemidlets effekt til tid og virkning. For eksempel kan knusing av blodtrykksenkende tabletter gi et hurtigere opptak og større blodtrykksfall.
- Delestrek/delekors er fra produsentens side laget for å lette svelging ved at hele tablettene kan svelges i delmengder. Ved deling vil tablettene i de fleste tilfeller få ulik størrelse og mengde virkestoff per del, og i tillegg vil det ofte bli noe svinn i form av små biter/pulver, som løsner under prosessen. Knuse-/delelisten er derfor kun tiltenkt tilfeller der hele dosen av legemidlet skal gis. Skal det likevel tas deldoser av tablettene, anbefales det å dele tablettene før utblanding i væske. Dette fremfor å røre ut hele tablettene i væske og ta ut delmengde, da det kan gi mer unøyaktig dose. For informasjon om deldoser, se [MAMBA](#) (Manipulering av medisiner til barn).

Sonde

Knuse-/delelisten er **ikke** tiltenkt som et verktøy for å undersøke om tabletter eller kapsler kan gis i sonde. Dette må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. For mer informasjon se [Legemidler i sonde](#). Faktorer som er viktige for vurdering av å gi legemidler i sonde:

- Størrelsen på sonden -kan legemidlet fysisk gå igjennom sondeslangen?
- Vil legemidlet tette sonden?
- Plassering av sonden -tas legemidlet opp der sonden er plassert?
- Adsorpsjon av legemidlet -er det risiko for at legemidlet fester seg til platen i sondeslangen?
- Kan legemidlet gis sammen med sondemat?

5. Definisjoner

Manipulering: Fysisk endring av et legemiddels legemiddelform, med det formål å lette administrering av legemidlet for pasienten. Eksempler er å knuse, dele, åpne, løse opp tablettene eller kapselen.

Peroral: Via munn.

6. Referanser

Anbefalingene i denne retningslinjen er basert på konsensus fra retningslinjemakerne og høringsinstansene (se AGREE metoderapport). Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn er disse referansene:

1. Farmasøytisk vurdering
2. [Norske legemiddelsestandarder](#) -NLS 2019.2
3. [Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler](#) (SPC)
4. Personlig meddelelse fra produsent
5. [Felleskatalogen/pakningsvedlegg](#)
6. Svensk/dansk/engelsk/fransk/tysk/spansk/kanadisk SPC
7. [Farmaceutiska specialiteter i Sverige](#) (FASS), svenske preparatomtaler
8. [Pro.medicin.dk, Dansk Lægemiddel Information A/S](#) (DLI), danske preparatomtaler
9. [Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes](#)
10. [RELIS](#) -regionale legemiddelinformasjonssentre
11. [Medicines for Children](#)
12. [Drugs.com](#)
13. [Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell](#)
14. [Uptodate](#)
15. [Avd. kompleks epilepsi - SSE- informasjonsskriv](#)
16. Micromedex, tilgjengelig via [helsebiblioteket.no](#)
17. MAMBA, tilgjengelig via [legemidlertilbarn.no](#)







Vedlegg

- [AGREE-Metoderapport.PDF](#)
- [KnuseDeleListen versjon 9.pdf](#)

Andre eHåndboksdokumenter

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

Retningslinje Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten)	Utskriftsdato: 29.06.2020
Dokumentansvarlig: Lisa Lundstrøm	Godkjent av: Hilde Myhren
Dokument-Id: 10301 - Versjon: 9	Side 2 av 3

-  [Cytostatika \(cellegift/kjemoterapi\) - administrering og avfallshåndtering](#)
-  [Tilrettelegging av arbeidet for gravide](#)
-  [Legemidler i sonde](#)
-  [Cytostatika \(cellegift/kjemoterapi\) - gravide, ammende og andre spesielle hensyn](#)
-  [Legemidler til barn 0-18 år. Bytteliste for perorale legemidler](#)
-  [Håndhygiene](#)

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

Retningslinje Tablett og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten)	Godkjent av: Hilde Myhren	Dokument-Id: 10301 - Versjon: 9	Utskriftsdato: 29.06.2020
Dokumentansvarlig: Lisa Lundstrøm			Side 3 av 3

NB! Knuse-/delelisten må ikke brukes uavhengig av prosedyreteksten i dokumentet "Tabletter og kapsler –deling, åpning og knusing" (Dok.-ID: 10301)

Knuse-/delelisten

A

Abacavir/Lamivudin (Mylan) Tablett	9 (A, OBS)
Abboticin ES (Amdipharm) Tablett	9 (A, OBS)
Abilify (Otsuka Pharm.) Smeltetablett	10, 15
Abilify (Otsuka Pharm.) Tablett	9
Abstral (Kyowa) Sublingvaltablett	7
Acalka (Ferrer Internacional) Depottablett	1
Acalka (Laboratorios Robert) Depottablett	1
Acetazolamide (Amdipharm) Tablett	9
Acetylcystein (Sandoz) Brusetablett	8
Acetylsalisylsyre (Actavis) Enterotablett	9
Actelsar HCT (Actavis) Tablett	9
Activelle (Novo Nordisk) Tablett	9 (OBS)
Actos (Takeda) Tablett	9
Adalat (Bayer) Kapsel	1
Adalat (Bayer) Tablett	9
Adalat CR (Bayer) Depottablett	1
Adalat Oros (Bayer) Depottablett	1
Adcirca (Lilly) Tablett	1
Adempas (Bayer) Tablett	9 (G, OBS)
Advagraf (Astellas) Depotkapsel	1 (OBS)
Aerius (MSD) Tablett	9
Aerius (MSD) Smeltetablett	1, 10, 15
Afi-D2 Forte (Takeda) Kapsel	2
Afinitor (Novartis) Tablett	1 (P)
Afipran (Takeda) Tablett	9
Akineton (S.I.T.) Tablett	9
Akynzeo (Orifarm) Kapsel	1
Albly-E (Takeda) Enterotablett	9
Aldactone (Pfizer) Tablett	9 (G, OBS)

Alea (Menarini) Tablett	9
Alendronat (Mylan) Tablett	12
Alkeran (Aspen) Tablett	1 (C)
Allopur (Takeda) Tablett	9
Allopurinol (Orion) Tablett	9
Aloxi (Helsinn Birex Pharma.) Kapsel	2
Amaryl (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Amias (Farmagon) Tablett	9
Aminess (Meda) Tablett	9
Amitriptylin (Abcur) Tablett	9
Amlodipin (Actavis) Tablett	9
Amoxicillin (Mylan) Tablett	9 (A, OBS)
Amoxicillin (Mylan) Kapsel	9 (A, OBS)
Amoxicillin (Sandoz) Oppløselig tablett	1, 9, 15 (A, OBS)
Anafranil (Novartis) Tablett	9
Anagrelide (Sandoz) Kapsel	1 (C)
Anastrozole (Teva) Tablett	9, 15 (OBS)
Andriol (MSD) Kapsel	2
Angusta Devats (Azanta) Tablett	9 (G, OBS)
Ansatisipin (Pfizer) Kapsel	15 (A, OBS)
Antabus (Actavis) Brusetablett	1, 8
Antepsin (Orion) Tablett	4, 15
Antidotum Thalli (Heyl) Kapsel	3, 15
Apocillin (Actavis) Tablett	9 (A, OBS)
Apodorm (Actavis) Tablett	9
Aponova (Boehringer I.) Depotkapsel	5
Apovit B-combin sterk (Nycomed) Tablett	9
Apresolin (Amdipharm) Tablett	9
Aprovel (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Aptivus (Boehringer I.) Kapsel	2 (A, OBS)
Aquadeks (Yasoo Health) Tyggetablett	14
Aquadeks Softgels (Yasoo Health) Kapsel	2
Arava (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (OBS)
Arcoxia (MSD) Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 1 av 16

Aricept (Pfizer) Tablett	9
Arimidex (AstraZeneca) Tablett	9, 15 (OBS)
Aripiprazole (Sandoz) Tablett	9
Aromasin (Pfizer) Tablett	9 (OBS)
Arthrotec (Pfizer) Tablett med modifisert frisetting	1
Asacol (Tillots Pharma) Enterotablett	1
Asacol (Tillots Pharma) Tablett med modifisert frisetting	1
Asasantin Retard (Boehringer I.) Kapsel med modifisert frisetting	5
Aspirin 500 mg (Bayer) Tablett	9
Aspirin 75 mg (Boots) Oppløselig tablett	9, 15
Aspirin 81 mg (Bayer) Tyggetablett	14, 15
Atacand (AstraZeneca) Tablett	9
Atacand Plus/ Atacand Plus Mite (AZ) Tablett	9
Atarax (UCB) Tablett	9
Atenolol (Mylan) Tablett	9
Atorvastatin (Mylan) Tablett	9, 15
Atozet (MSD) Tablett	9
Atripia (Gilead) Tablett	1 (A)
Attentin (Medice) Tablett	9
Aubagio (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (G, OBS)
Augmentin (GSK) Tablett	9 (A, OBS)
Aurorix (Meda) Tablett	9
Avelox (Bayer) Tablett	9 (A, OBS)
Avodart (GSK) Kapsel	12 (OBS)
Azilect (Teva) Tablett	9
Azitromax (Pfizer) Tablett	9 (A, OBS)

B

Bactrim (Roche) Tablett	9 (A, OBS)
Baklofen (Mylan) Tablett	9
Baraclude (BMS) Tablett	9 (A, OBS)
Behepan (Pfizer) Tablett	9
Benerva (Bayer) Tablett	9, 15

Benetor (Menarini) Tablett	9
Benetor Comp (Menarini) Tablett	9
Berocca (Weifa) Brusetablett	8, 9
Betapred (Sobi) Tablett	14, 15 (OBS)
Betmiga (Astella) Depottablett	1
Bicalutamid (Bluefish) Tablett	9 (G, OBS)
Biltricid (Bayer) Tablett	9
Bioclavid (Sandoz) Tablett	1 (A)
Bio-E-Vitamin (Pharma Nord) Kapsel	2
Bisolvon (Boehringer I.) Oppløselig tablett	13
Bisolvon (Boehringer I.) Tablett	9
Bisoprolol (Sandoz) Tablett	9
Bloxazoc (KRKA) Depottablett	4, 11
Bonefos (Bayer) Tablett	12
Bonviva (Roche) Tablett	12
Bosentan (Accord) Tablett	9 (G, OBS)
Bricanyl (AstraZeneca) Tablett	9
Bricanyl Depot (AstraZeneca) Depottablett	1
Brilique (AstraZeneca) Tablett	9, 15
Brintellix (Lundbeck) Tablett	9
Briviact (UCB) Tablett	9
Bronkyl/ Bronkyl Forte (Weifa) Brusetablett	8
Brufen Retard (BGP Products) Depottablett	1
B-Total (Nycoplus/Takeda) Tablett	9
Buprenorphine (Sandoz) Sublingvaltablett	7, 9
Burinex (LEO) Tablett	9
Buscopan (Boehringer I.) Tablett	9, 15
Buspiron (Orion) Tablett	9

C

Calcigran (Takeda) Tyggetablett	14, 15
Calcigran Forte (Takeda/2care4) Tyggetablett	14, 15
Calciumfolinat (Teva) Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 2 av 16

Calcium-Sandoz/Calcium-Sandoz Forte Brusetablett	8	Cipramil (Lundbeck) Tablett	9
Campral (Merck) Enterotablett	1	Ciprofloxacin (Actavis) Tablett	9 (A, OBS)
Candemox Comp (Sandoz) Tablett	9	Ciproxin (Actavis) Tablett	9 (A, OBS)
Candesartan (Sandoz) Tablett	9	Circadin (Neurim) Depottablett	1
Candesartan HCT (KRKA) Tablett	9	Cisordinol (Lundbeck) Tablett	9
Capecitabine (Accord) Tablett	1 (C)	Citalopram (Orion) Tablett	9
Captopril (Mylan) Tablett	9	Clarithromycin (Ratiopharm) Tablett	9 (A, OBS)
Carbaglu (Orphan Europe) Oppløselig tablett	15	Clarityn (Bayer) Tablett	9
Cardizem Retard (Pfizer) Depottablett	1	Cliovelle (Dr. Kade Pharma.) Tablett	9 (OBS)
Cardizem Uno (Pfizer) Depottablett	1	Clopidogrel (Actavis) Tablett	9
Carduran CR (Pfizer) Depottablett	1	Clozapin (Hexal) Tablett	9
Carvedilol (Hexal) Tablett	9	CoAprovel (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Casodex (AstraZeneca) Tablett	9 (G, OBS)	Colazid (Almirall) Kapsel	15
Cataflam (Novartis) Tablett	9	Colrefuz (Actavis) Tablett	9 (OBS)
Catapresan (Boehringer I.) Tablett	9	Combivir (ViiV Healthcare) Tablett	9 (A, OBS)
CeeNU (BMS) Kapsel	9 (C)	Concerta (Janssen) Depottablett	1
Celebra (Pfizer) Kapsel	5	Copegus (Roche) Tablett	1 (A)
Celebrex (2care4) Kapsel	5	Cordarone (Sanofi-Aventis) Tablett	9
CellCept (Roche) Kapsel	9 (G, OBS)	Corixil (Farmagon) Tablett	9
CellCept (Roche) Tablett	9 (G, OBS)	Cortef (Pfizer) Tablett	9 (OBS)
Celsentri (ViiV Healthcare) Tablett	1 (A)	Cortiment (Ferring) Depottablett	1
Centyl med kaliumklorid (LEO) Tablett	1	Cortisonacetat (Glostrup Apotek) Tablett	9 (OBS)
Centyl mite med kaliumklorid (LEO) Tablett	1	Cozaar (MSD) Tablett	9, 15
Certican (Novartis) Tablett	1 (OBS)	Cozaar Comp (MSD) Tablett	9, 15
Certican (Novartis) Oppløselig tablett	15 (OBS)	Cozaar Comp Forte (MSD) Tablett	9, 15
Cetimax (Vitabalans) Tablett	9	Creon (BGP Products) Enterokapsel	6
Cetirizin (Bluefish) Tablett	9	Cresemba (Unimedica) Kapsel	1 (A)
Chlorpromazine (Dr. Reddy's Lab.) Tablett	1	Crestor (AstraZeneca) Tablett	9, 15
Cholestagel (Gensyme) Tablett	9	Crixivan (MSD) Kapsel	1 (A)
Cicloserina (Antibiotice) Kapsel	9 (A, OBS)	C-vitamin (Nycoplus/Takeda) Brusetablett	8
Cimetidin (Acis) Tablett	9	Cycloserine (King Pharma.) Kapsel	9 (A, OBS)
Cimetidine (Accord) Tablett	9	Cyklokapron (Meda) Tablett	9
Cinaclet (Accord) Tablett	9	Cymbalta (Eli Lilly) Enterokapsel	6
Ciprallex (Lundbeck) Tablett	9	Cyproheptadine (Teva) Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 3 av 16

Cytotec (Pfizer) Tablett 9 (G, OBS)

D

D3-vitamin (Nycoplus/Takeda) Tablett	9
Daklinza (BMS) Tablett	9 (A, OBS)
Dalacin (Pfizer) Kapsel	12 (A, OBS)
Danol (Sanofi-Aventis) Kapsel	1
Dantrium (Norgine) Kapsel	9
Dapson (Scanpharm) Tablett	9 (A, OBS)
Daraprim (GSK) Tablett	9
Daxas (AstraZeneca) Tablett	9
Dekristol (Specific Pharma) Kapsel	2
Depakote Sprinkle (Abbott) Enterokapsel	15
Deprakine (Sanofi-Aventis) Enterotablett	1
Descovy (Gilead) Tablett	1 (A)
Detrusitol SR (Pfizer) Depotkapsel	5
Dexametason (Abcur) Tablett	9 (OBS)
Diamox (Amdipharm) Tablett	9
Diamox SR (Amdipharm) Depotkapsel	1
Diclin (2care4) Kapsel	9, 15 (A, OBS)
Dicocil (BMS) Kapsel	9, 15 (A, OBS)
Diclofenac (Bluefish) Enterotablett	1
DiclofenacKalium (Ratiopharm) Tablett	9
Dicloxacillin (Orion) Kapsel	9, 15 (A, OBS)
Dicuno (Vitabalans) Tablett	9
Difclir (Astellas) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Diflucan (Pfizer) Kapsel	9 (A, OBS)
Digimerck Pico (Merck) Tablett	9
Digoxin (Takeda) Tablett	9
Diovan (Novartis) Tablett	9
Diovan Comp (Novartis) Tablett	9
Disprin (Reckitt Benckiser) Oppløselig tablett	15
Diural (Actavis) Tablett	9, 15

Divisun (Meda) Tablett	9
Dociton Retard (Mibe) Depotkapsel	5
Doksycyklin (Hexal) Tablett	12, 15 (A, OBS)
Dolcontin (Pfizer) Depottablett	1
Donepezil (Actavis) Tablett	9
Dormicum (Roche) Tablett	9
Dostinex (Pfizer) Tablett	9, 15
Doxylin (Actavis) Tablett	12, 15 (A, OBS)
Dulcolax (Boehringer I.) Enterotablett	1
Duloxetin (Pensa Pharma) Enterokapsel	6
Duodart (GSK) Kapsel	12 (OBS)
Durbis Retard (Sanofi-Aventis) Depottablett	4
Duroferon Duretter (ACO HUD) Depottablett	1

E

Ebastin (Orifarm) Tablett	9
Ebixa (Lundbeck) Tablett	9
Edurant (Janssen) Tablett	1 (A)
Efavirenz (Sandoz) Tablett	9 (A, OBS)
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Tablett	1 (A)
Efexor Depot (Pfizer) Depotkapsel	5
Efient (Daiichi Sankyo) Tablett	9
Egazil Duretter (BioPhausia) Depottablett	1
Ekvacillin (Meda) Tablett	9 (A, OBS)
Eldepryl (Orion) Tablett	9, 15
Eliquis (BMS) Tablett	9, 15
Elvanse (Shire Pharm.) Kapsel	15
Emconcor/Emconcor CHF (Merck) Tablett	9
Emend (MSD) Kapsel	15
Emselex (Merus Labs) Depottablett	1
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (Sandoz) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Emtriva (Gilead) Kapsel	1 (A)
Enalapril (Sandoz) Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 4 av 16

Enalapril Comp (Ratiopharm) Tablett	9
Enalapril HCT (Hexal) Tablett	9
Entecavir (Sandoz) Tablett	9 (A, OBS)
Entocort (Tillots) Depotkapsel	5
Entresto (Novartis) Tablett	9
Eplusa (Gilead) Tablett	9 (A, OBS)
Epivir (ViiV Healthcare) Tablett	9 (A, OBS)
Eplerenon (Medical Valley) Tablett	9
Equasym Depot (Shire) Kapsel med modifisert frisetting 5	
Eremfat (Riemser) Tablett	9 (A, OBS)
Ery-Max (Meda) Enterokapsel	5 (A, OBS)
Esbriet (Roche) Kapsel	1 (OBS)
Esbriet (Roche) Tablett	1 (OBS)
Escitalopram (Actavis) Tablett	9
Esidrex (Novartis) Tablett	9
Esomeprazol (Krka) Enterokapsel	5
Esopral (Farmagon) Enterotablett	1, 11
Etalpa (Leo) Kapsel	2
Etoricoxib (Sandoz) Tablett	9
Eucreas (Novartis) Tablett	9
Eviplera (Gilead) Tablett	1 (A)
E-vitamin (Nycoplus/Takeda) Kapsel	2
Evotaz (BMS) Tablett	1 (A)
Exelon (Novartis) Kapsel	1
Exemestan (Sandoz) Tablett	9 (OBS)
Exforge (Novartis) Tablett	9
Exforge HTC (Novartis) Tablett	9
Exjade (Novartis) Oppløselig tablett	13
Exjade (Novartis) Tablett	9
Exviera (AbbVie) Tablett	1 (A)
Ezetimibe (Accord) Tablett	9
Ezetrol (MSD) Tablett	9

F

Famotidin (Stada) Tablett	9
Fampyra (Biogen) Depottablett	1
Felodipin (Hexal) Depottablett	1
Femar (Novartis) Tablett	9 (OBS)
Femara (Orifarm) Tablett	9 (OBS)
Fenantoin (Meda) Tablett	9
Fenazon-Koffein/ Fenazon-Koffein sterke Tablett	9
Fenemal (Takeda) Tablett	9
Fenofibrate (Impax Generics) Tablett	9
Fenytoin (NAF) Tablett	9
Ferromax (Weifa) Tablett	1
Ferro-Retard (Nycoplus/Takeda) Depottablett	1
Fevarin (BGP Products) Tablett	12
Finasterid (Actavis) Tablett	9, 15 (G, OBS)
Flagyl (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (A, OBS)
Flecainid (Sandoz) Tablett	9
Florinef (Aspen) Tablett	9 (OBS)
Fluanxol (Lundbeck) Tablett	9, 15
Fluconazol (KRKA) Kapsel	9 (A, OBS)
Fludara (Genzyme) Tablett	1 (C)
Fluoxetin (Mylan) Kapsel	15
Fluoxetin (Sandoz) Oppløselig tablett	11
Flutamid (Orion) Tablett	9
Folsyre (NAF) 1 mg Tablett	9
Fontex (Lilly) Oppløselig tablett	11
Fortecortin (Abcur) Tablett	9 (OBS)
Forxiga (Astra Zeneca) Tablett	1
Fosamax (MSD) Tablett	12
Fosrenol (Shire) Tyggetablett	14
Frisium (Sanofi-Aventis) Tablett	9, 15
Fucidin (LEO) Tablett	9 (A, OBS)
Furadantin (Meda) Tablett	9, 15 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 5 av 16

Furix (Takeda) Tablett	9, 15
Furix Retard (Takeda) Depotkapsel	5
Furosemid (Orion) Tablett	9, 15
Fycompa (Eisai) Tablett	9

G

Galantamin (Krka) Depotkapsel	5
Galvus (Novartis) Tablett	9
Gaviskon (Nordic Drugs) Tyggetablett	14
Genvoya (Gilead) Tablett	1 (A)
Gilenya (Novartis) Kapsel	9 (G, OBS)
Glaupax (Unimedica) Tablett	9
Gleostine (NextSource Biotechnology) Kapsel	9 (C)
Glibenclamid (Ratiopharm) Tablett	4
Glimepirid (Hexal) Tablett	9
Glivec (Novartis) Tablett	4, 15 (G, P)
Glucophage (Merck) Tablett	9
Glucosamin (Orifarm) Tablett	9
Granisetron (BMM) Tablett	9, 15
Gravidam (Accord) Tablett	9
Grazax (ALK) Smeltetablett	7

H

Haldol (Janssen) Tablett	9
Haloperidol (Neuraxpharm Specific.) Tablett	9
Harvoni (Gilead) Tablett	9 (A, OBS)
Heminevrin (Cheplapharm) Kapsel	1
Hepsera (Gilead) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Hiprex (Meda) Tablett	9 (A, OBS)
Hycamtin (Novartis) Kapsel	1 (C)
Hydrea (Orifarm) Kapsel	15 (C)
Hydrochlorothiazide (Orifarm) Tablett	9
Hydrocortisone (Auden Mckenzie) Tablett	9 (OBS)

Hydrokon (NAF) Tablett	9
Hydroxyurea (Medac) Kapsel	15 (C)
Hydroxyzine (Orifarm) Tablett	9

I

Ibandronsyre (Medical Valley) Tablett	12
Ibumax (Vitabalans) Tablett	9, 15
Ibumetin (Takeda) Tablett	9, 15
Ibux (Weifa) Kapsel	2
Ibux (Weifa) Tablett	9, 15
Iclusig (Incyte) Tablett	1 (P)
Idebenone (Kirkman Lab.) Kapsel	15
Imacillin (Meda) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Imatinib (Accord) Tablett	4, 15 (G, P)
Imatinib (Cipla) Kapsel	15 (G, P)
Imbruvica (Janssen) Kapsel	1 (P)
Imdur (AstraZeneca) Depottablett	4
Imigran (GSK) Tablett	9
Imigran Radis (GSK) Tablett	9, 15
Imnovid (Celgene) Kapsel	1 (OBS)
Imodium (McNeil) Tablett	9, 15
Imogas (McNeil) Kapsel	2
Imovane (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Imurel (Aspen) Tablett	9 (G, OBS)
Inderal (AstraZeneca) Tablett	9
Indomet (Ratiopharm) Kapsel	15
Inegy (MSD) Tablett	9
Inexium (Farmagon) Enterotablett	1, 11
Infloran (Laboratorio Farm.) Kapsel	15
Inovelon (Eisai) Tablett	9
Inspra (Pfizer) Tablett	9
Intelence (Janssen) Tablett	15 (A, OBS)
Invirase (Roche) Tablett	9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 6 av 16

Irbesartan (Actavis) Tablett	9
Irbesartan HCT (Actavis) Tablett	9
Iressa (AstraZeneca) Tablett	11 (G, P)
Isentress (MSD) Tyggetablett	14 (A, OBS)
Isentress (MSD) Tablett	1 (A)
Ismo (Riemser) Tablett	1
Ismo Retard (Riemser) Depottablett	1
Isoniazid (NAF) Tablett	9 (A, OBS)
Isoptin (BGP Products) Tablett	9
Isoptin Mite (Abbot) Tablett	9
Isoptin Retard (BGP Products) Depottablett	4
Isosorbidmononitrat (Mylan) Tablett	9
Isotretinoin (Orifarm) Kapsler	2 (OBS)
Ixoten (Baxter) Tablett	1 (C)

J

Jakavi (Novartis) Tablett	9 (G, P)
Janumet (MSD) Tablett	9, 15
Januvia (MSD) Tablett	9, 15
Jardiance (Boehringer I.) Tablett	9

K

Kalcipos-Vitamin D (Meda) Tablett	9, 15
Kaleorid (Leo) Depottablett	1
Kaletra (AbbVie) Tablett	1 (A)
Kaliumjodid (Recip) Tablett	9, 15
Kaliumklorid (Orifarm) Depottablett	1
Kalsium (Weifa) Tyggetablett	14, 15
Kalsium m/vit D3 (Farmagon) Tyggetablett	14, 15
Kandesartan (Farmagon) Tablett	9
Kandesartan HCT (Farmagon) Tablett	9
Keflex (Eurocept I.) Tablett	9 (A, OBS)
Keppra (UCB) Tablett	9

Kestine (Almirall) Tablett	9
Kettesse (Menarini Int.) Tablett	9
Ketoconazole (HRA Pharma) Tablett	9 (A, OBS)
Ketorax (Pfizer) Tablett	9
Ketovite (Essential Pharm. Ltd) Tablett	9
Kivexa (ViiV Healthcare) Tablett	9 (A, OBS)
Klacid OD (BGP Products) Depottablett	1 (A)
Klomipramin (Mylan) Tablett	9
Kodein (Takeda) Tablett	9
Kohle-Compretten (Merck) Tablett	15
Kolkisin (NAF) Tablett	9 (OBS)
Kredex (Roche) Tablett	9
Kreon (Orifarm) Enterokapsel	6
Kuvan (BioMarin Int.) Oppløselig tablett	9, 13

L

Lamictal (GSK) Oppløselig tablett/Tyggetablett	14, 15
Lamisil (Novartis) Tablett	9 (A, OBS)
Lamprene (Novartis) Myk kapsel	1 (A)
Lanoxin (Aspen) Tablett	9
Lansoprazol (Pensa Pharma) Enterokapsel	5
Lanvis (GSK) Tablett	9 (C)
Lanzo Melt (Pfizer) Smeltetablett	1, 10, 11
Largactil (Spesific Pharma) Tablett	1
Lariam (Roche) Tablett	9, 15
Lasix Retard (Sanofi-Aventis) Depotkapsel	5
Latuda (Takeda) Tablett	9
Leflunomide (Medac) Tablett	9 (OBS)
Leponex (Novartis) Tablett	9
Lerkanidipin (Actavis) Tablett	9
Lescol (Novartis) Kapsel	1
Lescol Depot (Novartis) Depottablett	1
Letrozol (Accord) Tablett	9 (OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 7 av 16

Leukeran (Aspen) Tablett	1 (C)
Levaxin (Takeda) Tablett	9, 15
Levomepromazine (Orion) Tablett	9
Linezolid (Accord) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Lioresal (Novartis) Tablett	9
Liothyronin (Takeda) Tablett	9
Lipitor (Pfizer) Tablett	9, 15
Lisinopril (Ratiopharm) Tablett	9
Lisinopril HTC (Actavis) Tablett	9
Liskantin (Desitin) Tablett	9
Lithionit (BioPhausia) Depottablett	4
Litiumkarbonat (OBA Pharma) Tablett	9
Lixiana (Daiichi Sankyo) Tablett	9
Lodox (Merck) Tablett	9
Lomir (Novartis) Tablett	9
Lomir SRO (Novartis) Depotkapsel	1
Lomustine (Medac) Kapsel	9 (C)
Loniten (Pfizer) Tablett	9
Loperamid (Mylan) Kapsel	9
Lopid (Pfizer) Kapsel	15
Loratadin (Hexal) Tablett	9
Lorazepam (Apotex) Tablett	9
Losartan (KRKA) Tablett	9, 15
Losartan HTC (KRKA) Tablett	9, 15
Losec Mups (AstraZeneca) Enterotablett	11
Lovastatin (Ratiopharm) Tablett	9, 15
Lymecyclin (Actavis) Kapsel	12 (A, OBS)
Lynparza (AstraZeneca) Kapsel	1 (C)
Lyrica (Pfizer) Kapsel	15
Lysodren (HRA Pharma) Tablett	9 (C)

M

Madopar (Roche) Kapsel	15
------------------------	----

Madopar Depot (Roche) Depotkapsel	1
Madopar Solubile (Roche) Oppløselig tablett	15
Magnesium (Nycoplus/Takeda) Tyggetablett	14
Magnesium 350 mg (Nycoplus/Takeda) Tablett	9
Malarone (GSK) Tablett	9
Malarone Junior (GSK) Tablett	9
Malfin (Teva) Depottablett	1
Marevan (Takeda) Tablett	9
Marevan u/farge (Takeda) Tablett	9
Marzine (Meda) Tablett	9
Maxalt (MSD) Tablett	1
Maxalt Rapitab (MSD) Smeltetablett	10, 15
Medikinet (Medice) Kapsel med modifisert frisetting	5
Medikinet (Medice) Tablett	9
Medrol (Pfizer) Tablett	9, 15 (OBS)
Medrol (Unimedica) Tablett	9, 15 (OBS)
Melatonin (Karuna) Kapsel	9
Melatonin (Orifarm) Tablett	9
Melatonin PR (KAL) Depottablett	1
Melatonina (Specific) Tablett	9
Meloxicam (Bluefish) Tablett	9
Memantin (Accord) Tablett	9
Mestinon (Meda) Tablett	9
Metadon (Abcur) Tablett	9, 15
Metamina (Recip) Tablett	9
Metformin (Weifa) Tablett	9
Methotrexate (Teva) Tablett	4, 15 (C)
Methylidopa (Stada) Tablett	9
Methylphenidate (Sandoz) Depottablett	1
Methylprednisolone (Orion) Tablett	9, 15 (OBS)
Metoclopramide (Orifarm) Tablett	9
Metoprolol (Mylan) Tablett	9
Metoprolol (Sandoz) Depottablett	4, 11
Metronidazol (Actavis) Tablett	9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 8 av 16

Mexiletine (Teva) Kapsel	9
Mezavant (Shire Pharma.) Enterodepottablett	1
Micardis (Boehringer I.) Tablett	9, 15
MicardisPlus (Boehringer I.) Tablett	9
Mifepristone (Linepharma) Tablett	9 (G)
Miktosan (Sandoz) Kapsel med modifisert frisetting	1
Mimpara (Amgen) Tablett	9
Mindiab (Pfizer) Tablett	9, 15
Minifom (Aco Hud) Kapsel	2
Minirin (Ferring) Smeltetablett	7
Mirtazapin (Bluefish) Smeltetablett	1, 10, 15
Mirtazapin (Hexal) Tablett	9
Mobic (Boehringer I.) Tablett	9
Moclobemid (Ratiopharm) Tablett	9
Modifenac (Actavis) Kapsel med modifisert frisetting	5
Modiodal (Teva) Tablett	9
Moduretic Mite (MSD) Tablett	9
Mogadon (Meda) Tablett	9
Molipaxin (Zentiva) Kapsel	9
Monoket OD (UCB) Depotkapsel	5
Montelukast (Teva) Tablett	9
Montelukast (Teva) Tyggetablett	14
Morfin (Takeda) Tablett	9
Motilium (Janssen-Cilag) Tablett	9
Moventig (Kyowa Kirin) Tablett	9
Moxonidin (Actavis) Tablett	9
Mucomyst (Meda) Brusetablett	8
Multaq (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Myambutol (Orifarm) Tablett	9 (A, OBS)
Myfenax (Teva) Kapsel	9 (G, OBS)
Myfenax (Teva) Tablett	9 (G, OBS)
Myfortic (Novartis) Enterotablett	9 (G, OBS)
Mykofenolat (Accord) Kapsel	9 (G, OBS)
Mykofenolsyre (Accord) Enterotablett	9 (G, OBS)

Myleran (Vitaflo) Tablett 1 (C)

N

Naltrexone (POA Pharma) Tablett	9
Napren-E (Takeda) Enterotablett	1
Naproxen (Mylan) Tablett	9
Naproxen-E (Mylan) Enterotablett	1
Naramig (Farmagon) Tablett	9
Natriumklorid (Abcur) Tablett	9
Natron (NAF) Tablett	9
Natulan (Sigma-Tau) Kapsel	1
Navelbine (Pierre Fabre) Kapsel	1 (C)
Navoban (Primius Lab) Kapsel	9
Naxogin (Pfizer) Tablett	9 (OBS)
Nemdatine (Actavis) Tablett	9
Neofordex (CTRS) Tablett	9 (OBS)
Neo-Mercazole (Amdipharm) Tablett	9
Neotigason (Actavis) Kapsel	9 (OBS)
Neurontin (Pfizer) Tablett	9
Neurontin (Pfizer) Kapsel	15
Nexavar (Bayer) Tablett	1 (P)
Nexium (AstraZeneca) Enterotablett	1, 11
Niaspan (Abbot) Depottablett	1
Nifedipin AL (Aliud) Kapsel	1
Nifenova (Alternova) Depottablett	1
Niferex (UCB) Enterokapsel	5
Nimoral (DeVats) Tablett	9 (OBS)
Nimotop (Bayer) Tablett	1
Nitroglycerin (Takeda) Sublingvaltablett	7
Nobligan (Grünenthal) Kapsel	15
Nobligan Retard (Grünenthal) Depottablett	1
Nocdurna (Ferring) Smeltetablett	7
Nolvadex (AstraZeneca) Tablett	9, 15 (G, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 9 av 16

Noritren (Lundbeck) Tablett	9
Normix (Alfa Wassermann) Tablett	3, 9 (A, OBS)
Normorix Mite (Takeda) Tablett	9
Norprolac (Ferring) Tablett	9
Norvasc (Pfizer) Tablett	9
Norvir (AbbVie) Tablett	1 (A)
Noskapin (Takeda) Tablett	9
Novaluzid (Meda) Tyggetablett	14
Noxafil (MSD) Enterotablett	1 (A)
Nozinan (Meda) Tablett	9, 15
Nuelin Depot (Meda) Depottablett	4
Nycoplus B-Total (Takeda) Tablett	9
Nycoplus C-vitamin (Takeda) Brusetablett	8
Nycoplus C-vitamin (Takeda) Tablett	9
Nycoplus D3-vitamin (Takeda) Tablett	9
Nycoplus E-vitamin (Takeda) Kapsel	2
Nycoplus Ferro-Retard (Takeda) Depottablett	1
Nycoplus Folsyre 0,4 mg (Takeda) Tablett	9
Nycoplus Magnesium (Takeda) Tyggetablett	14
Nycoplus Magnesium 350 mg (Takeda) Tablett	9
Nycoplus Multivitamin (Takeda) Tablett	9
Nycoplus Selen med E-vitamin (Takeda) Tablett	9

O

Odefsey (Gilead) Tablett	1 (A)
Ofev (Boehringer I.) Kapsel	1 (P)
Olanzapin (Teva) Smeltetablett	1, 10, 15
Olanzapin (Teva) Tablett	9
Olmotec (Daiichi Sankyo) Tablett	9
Olmotec Comp (Daiichi Sankyo) Tablett	9
Olysio (Janssen) Kapsel	1 (A)
Omacor (Pronova) Kapsel	2
Omeprazol (Bluefish) Enterokapsel	6

Omic (Astellas) Depottablett	1
Ondansetron (Bluefish) Smeltetablett	9, 10, 15
Ondansetron (Bluefish) Tablett	9
Onglyza (AstraZeneca) Tablett	1
Opryme (KRKA) Tablett	9
Opsumit (Actelion) Tablett	1
Optinate Septimum (Actavis) Tablett	12
Orfiril (Desitin) Enterotablett	1
Orfiril Long (Desitin) Depotkapsel	5
Orfiril Retard (Desitin) Depottablett	1
Orisild (Orion) Tablett	9
Orodek (Menarini Int.) Tablett	9
Orudis (Sanofi-Aventis) Depotkapsel	5
Ospolot (Desitin) Tablett	9
Otezla (Celgene) Tablett	1 (OBS)
Ovesterin (Aspen) Tablett	9 (OBS)
Oxycodone (Actavis) Kapsel	15
OxyContin (Mundipharma) Depottablett	1
Oxydorine (Orifarm) Depottablett	1
OxyNorm (Mundipharma) Kapsel	9

P

Padviram (Sandoz) Tablett	1 (A)
Palexia (Grünenthal) Tablett	9
Palexia Depot (Grünenthal) Depottablett	1
Palladon (Mundipharma) Depotkapsel	5
Pamol (Takeda) Tablett	9
Pamol (Takeda) Smeltetablett	10, 15
Panodil (GSK) Tablett	9
Panodil Zapp (GSK) Tablett	9
Pantoprazol (Pensa Pharma) Enterotablett	1
Paracet (Weifa) Tablett	9
Paracet (Weifa) Brusetablett	8

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 10 av 16

Paracet (Weifa) Smeltetablett	10, 15
Paracetamol (Orifarm) Tablett	9
Paralgin Forte (Weifa) Tablett	9
Paramax (Vitabalans) Tablett	9
Paramax Comp (Vitabalans) Tablett	9
Paricalcitol (Alternova) Kapsel	2
Parlodel (Meda) Tablett	9
Paroxetin (Actavis) Tablett	9
Penomax (Orion) Tablett	9 (A, OBS)
Pentasa (Ferring) Depottablett	4, 11
Pepcid (McNeil) Tablett	9
Perigona (MIP Pharma) Tablett	9
Peritol (Infecto Pharm) Tablett	9
Perphenazin Tablett	9
Persantin (Boehringer I.) Tablett	9
Persantin Retard (Boehringer I.) Kapsel med modifisert frisetting	5
Peteha (Riemser Pharma) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Phenergan (Sanofi-Aventis) Tablett	9, 15
Phenhydan (Desitin) Tablett	9
Phenytoin AWD (Teva) Tablett	9
Phosphate-sandoz (HK Pharma) Brusetablett	8
Physiotens (BGP Products) Tablett	9
Pinex (Actavis) Brusetablett	8
Pinex (Actavis) Tablett	9
Pinex (Actavis) Smeltetablett	10, 15
Pinex Forte (Actavis) Brusetablett	8
Pinex Forte (Actavis) Tablett	9
Pioglitazone (Teva) Tablett	9
Plaquenil (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Plavix (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Plenadren (Shire) Tablett med modifisert frisetting	1
Plendil (AstraZeneca) Depottablett	1
Polaramin (MSD) Tablett	9
Postafen (Terali) Tablett	9

Pradaxa (Boehringer I.) Kapsel	1
Pramipexole (Orion) Tablett	9
Pranolol (Actavis) Tablett	9
Pravachol (BMS) Tablett	9
Pravastatin (Sandoz) Tablett	9
Precosa (Biocodex) Kapsel	15 (OBS)
Prednisolon (Alternova) Tablett	9 (OBS)
Prednisolone (Focus Pharma.) Oppløselig tablett	1, 8 (OBS)
Prednisolone (Sovereign) Oppløselig tablett	1, 8 (OBS)
Prezista (Janssen) Tablett	9 (A, OBS)
Primaquine Phosphat (Sanofi) Tablett	9
Probecid (Biophausia) Tablett	9
Prograf (Astellas) Kapsel	3 (OBS)
Progynova (Bayer) Tablett	9 (OBS)
Propal Retard (Sandoz) Depotkapsel	5
Propranolol (Takeda) Tablett	9
Proscar (MSD) Tablett	9, 15 (G, OBS)
Provaqomyl (Mylan) Tablett	9
Provera (Pfizer) Tablett	9 (OBS)
Proxan (Weifa) Tablett	9
Puri-Nethol (Aspen) Tablett	4 (C)
Pursennid (GSK) Tablett	9
Pyrazinamid (mibe GmbH) Tablett	9 (A, OBS)
Pyridoksin (NAF) Tablett	9

Q

Quetiapin (Sandoz) Tablett	9
Quetiapine (Accord) Depottablett	1

R

Ramipril (Actavis) Tablett	9
Ranitidin (Ratiopharm) Tablett	9
Rapamune (Pfizer) Tablett	1 (OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Rasagilin (Accord) Tablett	9
Rasilez (Novartis) Tablett	9
Rebetol (MSD) Kapsel	1 (A)
Relifex (Meda) Oppløselig tablett	8
Relifex (Meda) Tablett	9
Relpax (Pfizer) Tablett	9
Reltebon (Actavis) Depottablett	1
Remeron (MSD) Tablett	9
Remeron-S (Bluefish) Smeltetablett	1, 10, 15
Reminyl (Janssen) Depotkapsel	5
Renagel (Farmagon) Tablett	1
Renavit (RenaCare) Tablett	9
Renitec (MSD) Tablett	9
Renitec Comp/ Renitec Comp Mite (MSD) Tablett	9
Renvela (Genzyme) Tablett	1
Requip (Farmagon) Tablett	9, 15
Requip Depot (GSK) Depottablett	1
Resochin (Bayer) Tablett	9
Revatio (Pfizer) Tablett	9
Revlimid (Celgene) Kapsel	1 (OBS)
Revolade (Novartis) Tablett	9
Reyataz (BMS) Kapsel	6 (A, OBS)
Rezolsta (Janssen) Tablett	1 (A)
Riamet (Novartis) Tablett	9
Rifater (Sanofi-Aventis) Tablett	1 (A)
Rifinah (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (A, OBS)
Rilutek (Aventis) Tablett	9
Riluzol (Actavis) Tablett	9
Rimactan (Orifarm) Kapsel	9 (A, OBS)
Rimactan (Sandoz) Kapsel	9 (A, OBS)
Rimactazid (Sandoz) Tablett	9 (A, OBS)
Rimcure (Sandoz) Tablett	1 (A)
Rimstar (Sandoz) Tablett	1 (A)
Rinexin (Recip) Depottablett	1

Risperdal (Janssen) Tablett	9, 15
Risperidon (Sandoz) Tablett	9, 15
Ritalin (Novartis) Tablett	9
Ritalin (Novartis) Kapsel med modifisert frisetting	5
Ritonavir (Accord) Tablett	1 (A)
Rivastigmin (Orion) Kapsel	1
Rivotril (Roche) Tablett	9
Rocaltrol (Roche) Kapsel	2
Ropinirol (Krka) Depottablett	1
Ropinirol (Mylan) Tablett	9, 15
Rosuvastatin (Sandoz) Tablett	9, 15

S

Sabrilix (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (OBS)
Salazopyrin EN (Pfizer) Enterotablett	1
Samin (Weifa) Tablett	9
Samsca (Otsuka Pharmaceutical) Tablett	9, 15
Sandimmun Neoral (Novartis) Kapsel	1 (OBS)
Sarotex (Lundbeck) Tablett	9
Sarotex Retard (Lundbeck) Depotkapsel	5
Sebivo (Novartis) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Selen med E-vitamin (Nycoplus/Takeda) Tablett	9
Selexid (Leo) Tablett	9 (A, OBS)
Selo-Zok (AstraZeneca) Depottablett	4, 11
Sendoxan (Baxter) Tablett	1 (C)
Serdolect (Lundbeck) Tablett	9
Seroquel (AstraZeneca) Tablett	9
Seroquel Depot (AstraZeneca) Depottablett	1
Seroxat (GSK) Tablett	9
Sertralain (Hexal) Tablett	9, 15
Sevelamer (Sandoz) Tablett	1
Sevikar (Daiichi Sankyo) Tablett	9
Sifrol (Boehringer I.) Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Sifrol (Boehringer I.) Depottablett	1
Simvastatin (Sandoz) Tablett	9, 15
Sinalfa (Amdipharm) Tablett	9
Sinemet (MSD) Tablett	9, 15
Sinemet Depot Mite (MSD) Depottablett	1
Sinequan (Pfizer) Kapsel	15
Singulair (MSD) Tablett	9
Singulair (MSD) Tyggetablett	14
Sirturo (Janssen) Tablett	9 (A, OBS)
Sivextro (MSD) Tablett	9 (A, OBS)
Skilarence (Amirall) Enterotablett	1 (OBS)
Sobril (Pfizer) Tablett	9, 15
Solian (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Solupred (Aventis) Brusetablett	8, 9 (OBS)
Solvezink (BioPhausia) Brusetablett	8, 9
Somac (Takeda) Enterotablett	1
Sotacor (BMS) Tablett	9, 15
Sotalol (Mylan) Tablett	9, 15
Sovaldi (Gilead) Tablett	9 (A, OBS)
Spiricort (Spirig Healthcare) Tablett	9 (OBS)
Spirix (Takeda) Tablett	9 (G, OBS)
Spiroonolactone (Orion) Tablett	9 (G, OBS)
Sporanox (Janssen) Kapsel	1 (A)
Sprycel (BMS) Tablett	1 (P)
Stalevo (Orion) Tablett	3, 9
Stayveer (Janssen) Tablett	9 (G, OBS)
Stemetil (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Stesolid (Actavis) Tablett	9
Stilnoct (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Stilnox (Farmagon) Tablett	9
Stocrin (MSD) Tablett	9 (A, OBS)
Strattera (Lilly) Kapsel	1
Stribild (Gilead) Tablett	1 (A)
Suboxone (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9

Subutex (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Sulfadiazine (Heyl) Tablett	9 (A, OBS)
Sumatriptan (Aurobindo) Tablett	9
Surmontil (Sanofi-Aventis) Tablett	9

T

Tacni (Teva) Kapsel	3 (OBS)
Tadalafil (Accord) Tablett	9
Tafinlar (Novartis) Kapsel	1 (P)
Tagrisso (AstraZeneca) Tablett	15 (G, P)
Tambocor (Meda) Tablett	9
Tambocor Retard (Meda) Depotkapsel	5
Tamiflu (Roche) Kapsel	9 (A, OBS)
Tamoxifen (Mylan) Tablett	9, 15 (G, OBS)
Tamsulosin (Mylan) Kapsel med modifisert frisetting	1
Tamsulosin (Ratiopharm) Depottablett	1
Tarceva (Roche) Tablett	15 (G, P)
Targiniq (Mundipharma) Depottablett	1
Targretin (Eisai Ltd.) Kapsel	2 (C)
Tarivid (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (A, OBS)
Tasigna (Novartis) Kapsel	6 (G, P)
Tavanic (Sanofi-Aventis) Tablett	9 (A, OBS)
Tavegyl (Novartis) Tablett	9
Tegretol (Novartis) Tablett	9, 15
Tegretol Retard (Novartis) Depottablett	4, 11
Telfast (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Telmisartan (Actavis) Tablett	9, 15
Temesta (Pfizer) Tablett	9, 15
Temgesic (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Temodal (MSD) Kapsel	6 (C)
Temomedac (Medac) Kapsel	6 (C)
Temozolomide (Accord) Kapsel	6 (C)
Tenofovir disoproxil (Teva) Tablett	9, 15 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 13 av 16

Tenormin (Pfizer) Tablett	9
Terbinafin (Orifarm) Tablett	9 (A, OBS)
Tetracyclin (Actavis) Tablett	15 (A, OBS)
Tetracyclin (Arco) Kapsel	15 (A, OBS)
Tetralysal (Galderma) Kapsel	12 (A, OBS)
Teveten (BGP) Tablett	9
Teveten Comp (BGP) Tablett	1
Thalidomide (Celgene) Kapsel	9 (G, OBS)
Theo-Dur (BioPhausia) Depottablett	4
Tiamin (NAF) Tablett	9, 15
Titralac (Takeda) Tablett	10, 14
Tivicay (ViiV Healthcare) Tablett	9 (A, OBS)
Toilax (Orion) Enterotablett	1
Tolvon (MSD) Tablett	9
Topimax (Janssen) Kapsel	5
Topimax (Janssen) Tablett	9
Topiramate (Bluefish) Tablett	9
Toviaz (Pfizer) Depottablett	1
Tracafour (2care4) Tablett	9
Tracleer (Actelion) Tablett	9 (G, OBS)
Trajenta (Boehringer I.) Tablett	9, 15
Tramadol (Hexal) Kapsel	15
Tramagetic OD (Mundipharma) Depottablett	1
Tramagetic Retard (Mundipharma) Depottablett	1
Trampalgin (Weifa) Tablett	4
Trandate (Aspen) Tablett	9
Trental (Sanofi-Aventis) Depottablett	1
Triatec (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Trientine (Univar) Kapsel	9
Trilafon (MSD) Tablett	9
Trilafon (Neopharmed Gentili) Tablett	9
Trileptal (Novartis) Tablett	9, 15
Trimetoprim (Orion) Tablett	9 (A, OBS)
Trimonil Retard (Desitin) Depottablett	4, 11

TrioBe (Meda) Tablett	9
Triumeq (ViiV Healthcare) Tablett	9 (A, OBS)
Trizivir (ViiV Healthcare) Tablett	1 (A)
Truvada (Gilead) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Truxal (Lundbeck) Tablett	9
Tyverb (Novartis) Tablett	1 (P)

U

Uptravi (Actelion) Tablett	9, 15
Urocit-k (Orphan) Depottablett	1
Uromitexan (Baxter) Tablett	9
Ursochol (Orifarm) Kapsel	9
Ursodeoksykolsyre (Strides Arcolab) Kapsel	9
Ursofalk (Dr. Falk) Kapsel	9
Ursofalk (Vifor) Tablett	9

V

Valaciclovir (Sandoz) Tablett	9 (A, OBS)
Valcyte (Roche) Tablett	1 (A, OBS)
Valganciclovir (Accord) Tablett	1 (A, OBS)
Valium (Roche) Tablett	9
Vallegan (Sanofi-Aventis) Tablett	9
Valsartan (Actavis) Tablett	9
Valsartan HCT (Actavis) Tablett	9
Valtrex (GSK) Tablett	9 (A, OBS)
Vancomycin (Xellia) Kapsel	1 (A)
Vanquin (Meda) Tablett	3
Velphoro (Vifor Fresenius) Tyggetablett	14
Vemlidy (Gilead) Tablett	9 (A, OBS)
Venclyxto (AbbVie) Tablett	9 (C)
Venlafaxin (Bluefish) Depotkapsel	5
Venlix (Ratiopharm) Tablett	9
Venorion (Orion) Depotkapsel	5

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Vepesid (BMS) Kapsel	2 (C)
Vesanoid (Cheplapharm) Kapsel	2 (C)
Vesicare (Astellas) Tablett	9 (OBS)
Vfend (Pfizer) Tablett	9 (A, OBS)
Viagra (Pfizer) Tablett	9, 15
Viekirax (AbbVie) Tablett	1 (A)
Vimovo (AZ) Tablett med modifisert frisetting	1
Vimpat (UCB) Tablett	9, 15
Viramune (Boehringer I.) Depottablett	1 (A)
Viramune (Boehringer I.) Tablett	9 (A, OBS)
Viread (2care4) Tablett	9, 15 (A, OBS)
Vival (Actavis) Tablett	9
Vivotif (PaxVax) Enterokapsel	1
Volibris (GSK) Tablett	9 (G, OBS)
Voltaren (Novartis) Enterotablett	1
Voltarol (GSK) Kapsel	2
Voltarol (GSK) Tablett	9
Voriconazole (Sandoz) Tablett	9 (A, OBS)
Vosevi (Gilead) Tablett	9 (A, OBS)
Votrient (Novartis) Tablett	1 (P)
Votubia (Novartis) Oppløselig tablett	15 (G, P)
Votubia (Novartis) Tablett	15 (G, P)

W

Weifa C-vitamin Brusetablett	8
Weifa Kalsium Tyggetablett	14, 15
Weifa Kalsium m/D-vit Tyggetablett	14, 15
Weifapenin Tablett	9 (A, OBS)
Wellbutrin Retard (GSK) Tablett med modifisert frisetting	1
Wilzin (Orphan) Kapsel	15

X

Xagrid (Shire) Kapsel	1 (C)
-----------------------	-------

Xalkori (Pfizer) Kapsel	1 (P)
Xanor (Pfizer) Tablett	9
Xanor Depot (Pfizer) Depottablett	1
Xarelto (Bayer) Tablett	9, 15
Xatral (Sanofi-Aventis) Depottablett	1
Xeljanz (Pfizer) Tablett	9 (OBS)
Xeloda (Roche) Tablett	1 (C)
Xenical (Orifarm) Kapsel	9
Xifaxan (Norgine) Tablett	3, 9 (A, OBS)
Xyzal (UCB) Tablett	9

Z

Zanidip (Meda) Tablett	9
Zantac (GSK) Brusetablett	8
Zantac (GSK) Tablett	9
Zavesca (Actelion) Kapsel	15
Zebinix (Eisai) Tablett	9
Zeffix (GSK) Tablett	9 (A, OBS)
Zeldox (Pfizer) Kapsel	1
Zemplar (AbbVie) Kapsel	2
Zentel (GSK) Tablett	9, 15
Zentel (GSK) Tyggetablett	14
Zepatier (MSD) Tablett	1 (A)
Zestoretic (AstraZeneca) Tablett	9
Zestoretic Mite (AstraZeneca) Tablett	9
Zestril (AstraZeneca) Tablett	9
Ziagen (ViiV Healthcare) Tablett	9 (A, OBS)
Ziprasidon (Actavis) Kapsel	1
Zocor (MSD) Tablett	9, 15
Zofran (Novartis) Smeltetablett	9, 10, 15
Zofran (Novartis) Tablett	9
Zolmitriptan (Sandoz) Smeltetablett	10
Zolmitriptan (Sandoz) Tablett	1

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 15 av 16

Zoloft (Pfizer) Tablett	9, 15
Zolpidem (Actavis) Tablett	9
Zomig (AstraZeneca) Tablett	9
Zomig Rapimelt (AstraZeneca) Smeltetablett	10
Zonegran (Eisai) Kapsel	15 (OBS)
Zopiklon (Mylan) Tablett	9
Zopitin (Vitabalans) Tablett	9
Zovirax (GSK) Tablett	9 (A, OBS)
Zyban (GSK) Depottablett	1
Zykadia (Novartis) Kapsel	15 (G, P)
Zyloric (Aspen) Tablett	9
Zyprexa (Lilly) Tablett	9
Zyprexa Velotab (Lilly) Smeltetablett	1, 10, 15
Zyrtec (UCB) Tablett	9
Zyvoxid (Pfizer) Tablett	9, 15 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 9	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 25.05.2020	Side 16 av 16