

INHALASJONSVÆSKER

Vurderingsgrunnlag:

Det var lite evidens på manipulering av inhalasjonsvæske. Kun ett virkestoff ble registrert manipulert i observasjonsstudien (ipratropiumbromid), og samme virkestoff ble rapportert på spørreskjema ved spørsmål om slik håndtering. Anbefalingene er derfor gjort på bakgrunn av ekspertpanelets erfaringer og kunnskap.

Anbefaling:

- Benytt per oral sprøyte til opptrekk av inhalasjonsvæske og overfør den til inhalasjonskammeret. NB! Dersom man trenger en kanyle for å kunne trekke opp inhalasjonsvæsken fra emballasjen, benytt adapter på peroral sprøyte for å få dette til. Ved mangel på adapter, bruk iv-sprøyte og kanyle. Kast kanylen etter opptrekk og sørg for at legemidlet blir overført til inhalasjonskammeret rett etter opptrekket for å forhindre at legemidlet blir gitt intravenøst.
- Bland væskene i inhalasjonskammeret med egnet redskap, fortrinnsvis ett som er sterilt.



Dette er et omarbeidet utdrag fra MODRIC-guideline, og er en del av MAMBA, se www.legemidlertilbarn.no/MAMBA.
Versjon oktober 2016.