

MIKSTURER

Vurderingsgrunnlag:

Systematisk gjennomgang av litteratur ga ingen funn med hensyn til manipulering av miksturer. Det ble ikke registrert slik manipulering i observasjonsstudien, og ingen rapporterte om slik håndtering på spørreskjema. Anbefalingene er derfor kun gjort på bakgrunn av ekspertpanelets erfaringer og kunnskap.

Fortynning av klare, vandige oppløsninger kan være uproblematisk. Derimot skal man være forsiktig med å fortynne ikke-vandige eller viskøse miksturer, samt suspensjoner. Rådfør deg med farmasøyt før fortynning foretas.

Anbefaling:

Sørg for at legen har rundet av forskrevet dose til et hensiktsmessig volum som lar seg trekke opp.

- Volumer mindre enn 5 ml må måles opp med peroral sprøyte.
- Ved doser på mindre enn 0,1 ml, må fortynning foretas for å kunne trekke opp nøyaktig dose. Rådfør deg med farmasøyt.
 - Ved fortynning utføres dette rett før administrasjon. Rester skal kastes.
 - Fortynningsvæsken må være forlikelig med innholdsstoffene i miksturen.



Dette et omarbeidet utdrag fra MODRIC-guideline, og er en del av MAMBA, se www.legemidlertilbarn.no/MAMBA.
Versjon oktober 2016