


N01A H01	<h1 style="text-align: center;">FENTANYL</h1> <h2 style="text-align: center;">Leptanal, Fentanyl (Hameln)</h2>				
Styrke	Stamløsning	Videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
50 mikrogram/ml inj.væske, ampulle og hetteglass		Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <sup>1,2</sup>  <u>Fortynningsvæske<sup>2,3,40</sup>:</u> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml  <u>Anbefalt minimumskonsentrasjon<sup>2,71</sup>:</u> <b>2 mikrogram/ml</b>	<u>IV injeksjon<sup>2,63,71,155</sup>:</u> 1-5 minutter *  <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon	<u>Ampuller<sup>15</sup>:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning<sup>2,3,15</sup>:</u> 12 timer i RT 24 timer i KJ  <u>Kontinuerlig infusjon<sup>2,3,15</sup>:</u> 24 timer i RT	<b>Antidot<sup>2</sup>:</b> <b>Nalokson</b>  Kan gi apné, respirasjonsdepresjon*, laryngo- og bronkospasme, arytmier, hypo- og hypertensjon, muskelrigiditet*, kvalme og oppkast <sup>2,4,5</sup>  Respirasjon og sirkulasjon må monitoreres <sup>4,5</sup>
Konsentrasjon: <b>50 mikrogram/ml</b>					
<p><b>Tilleggsopplysninger:</b> Bør kun brukes under overvåkning av anestesilege eller andre som er kjent med legemidlet<sup>2</sup>.            *Nyfødte og spedbarn er spesielt utsatt for muskelrigiditet som stivhet i thorax og kjeve, samt respirasjonsdepresjon.            Rask injeksjon og høye doser øker risikoen. Premedikasjon med benzodiazepiner og bruk av muskelrelaksantia reduserer risikoen for muskelrigiditet<sup>1,2,84</sup>.  <b>Y-settforlikelige væsker<sup>2,3</sup>:</b> NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og blandinger av disse, ev. tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter.</p>					
Blandekort til barn	Kilder: Se egen referanseliste	Sist endret: 01.03.2021	Versjon: 3.0		