


N01A X03		<b>KETAMIN</b> Ketalar, Ketamin (Abcur)			
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
10 mg/ml inj. væske, ampulle og hetteglass *		Kan gis uforynnet eller fortynnes videre <sup>1,2</sup>  <u>Fortynningsvæske<sup>2,3</sup>:</u> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	<u>IV injeksjon<sup>1,2,13</sup>:</u> Over minst 1 minutt  <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon	<u>Ampuller<sup>15</sup>:</u> Engangsbruk  <u>Anbrutt hetteglass<sup>3,15,41</sup>:</u> 7 dager i RT  <u>Kontinuerlig infusjon<sup>3,15,58</sup>:</u> 24 timer i RT	<b>Obs!</b> Tromboflebitt <sup>2</sup>  Kan gi respirasjonsdepresjon, hypo- og hypertensjon, brady- og takykardi, hallusinasjoner, krampelignende muskelbevegelser, kvalme og oppkast <sup>1,2,4</sup>  Respirasjon, blodtrykk og puls må monitoreres <sup>5,84</sup>
Konsentrasjon: <b>10 mg/ml</b>					
50 mg/ml inj. væske, ampulle og hetteglass *		<u>Anbefalt makskonsentrasjon v/ perifer administrasjon<sup>84</sup>:</u> <b>10 mg/ml</b>	Kan gis IM <sup>1,2</sup>		
Konsentrasjon: <b>50 mg/ml</b>					
<p><b>Tilleggsopplysninger:</b> *Hetteglassene er konserverte. Skal kun brukes under overvåking av anestesilege eller andre som er kjent med legemidlet<sup>1,2</sup>. <b>Y-settforlikelige væsker<sup>2,3</sup>:</b> NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og blandinger av disse, ev. tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter.</p>					
Blandekort til barn		Kilder: Se egen referanseliste		Sist endret: 01.01.2020	Versjon: 3.0