


C02A C01	<h1 style="text-align: center;">KLONIDIN</h1> <h2 style="text-align: center;">Catapresan</h2>				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
150 mikrogram/ml inj.væske, ampulle		Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre ^{84,96,160} <u>Fortynningsvæske^{3,101}:</u> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	<u>IV injeksjon/infusjon^{1,160}:</u> Over 10-15 minutter <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon	<u>Ampuller¹⁵:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsnings^{3,15,101}:</u> I glukose 50 mg/ml: 6 timer i RT I NaCl 9 mg/ml: 12 timer i RT 24 timer i KJ <u>Kontinuerlig infusjon^{3,15,101}:</u> I glukose 50 mg/ml: 6 timer i RT I NaCl 9 mg/ml: 24 timer i RT	Kan gi hypotensjon, svimmelhet, hodepine, sedasjon, munntørrhet, kvalme og oppkast ^{1,4,160} Kan gi forbigående blodtrykksøkning ved rask injeksjon ^{84,160} Risiko for hypertensiv krise v/ brå seponering ^{1,4} Monitorering av blodtrykk og puls bør vurderes ^{84,96}
Konsentrasjon: 150 mikrogram/ml (= 0,15 mg/ml)					
Tilleggsopplysninger: Y-settforlikelige væsker^{3,101}: NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og blandinger av disse, ev. tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter.					
Blandekort til barn	Kilder: Se egen referanseliste	Sist endret: 01.09.2021	Versjon: 3.0		