


N02A A05		<h1 style="text-align: center;">OKSYKODON</h1> <h2 style="text-align: center;">OxyNorm, Oxycodone (HamelN)</h2>			
Styrke	Stamløsning	Videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
10 mg/ml inj.væske, ampulle		<p>Må fortynnes videre v/ IV administrasjon^{2,84}</p> <p><u>Fortynningsvæske^{2,3:}</u> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml</p> <p><u>Anbefalt konsentrasjon^{2,4,84:}</u> 1 mg/ml</p>	<p><u>IV injeksjon^{37,155:}</u> Over 5-15 minutter *</p> <p><u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon</p> <p>Oksykodon 10 mg/ml kan gis ufortynnet som SC inj./inf.²</p>	<p><u>Ampuller^{15:}</u> Engangsbruk</p> <p><u>Fortynnet løsning^{2,3:}</u> 12 timer i RT 24 timer i KJ</p> <p><u>Kontinuerlig infusjon^{2,3:}</u> 24 timer i RT</p>	<p>Antidot^{2:} Nalokson</p> <p>Kan gi respirasjons- og CNS-depresjon, bronkospasme, dyspné, brady- og takykardi, hjertebank, hypotensjon, hodepine, svimmelhet, rødme, kvalme, oppkast, kløe og svetting^{1,2,4}</p> <p>Respirasjon, blodtrykk og puls bør monitoreres^{4,84}</p>
Konsentrasjon: 10 mg/ml					
50 mg/ml inj.væske, ampulle					
Konsentrasjon: 50 mg/ml					
<p>Tilleggsopplysninger: *Opioider kan gis raskere hvis situasjonen krever det, men for å unngå uønskede bivirkninger som ruseffekt og respirasjonsdepresjon, anbefales en administrasjonstid på minst 5 minutter.</p> <p>Y-settforlikelige væsker^{2,3:} NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og blandinger av disse, ev. tilsatt 30 mmol KCl/liter.</p>					
Blandekort til barn		Kilder: Se egen referanseliste		Sist endre: 01.05.2021	Versjon: 2.0