


N02B E01	<h1 style="text-align: center;">PARACETAMOL</h1> <p style="text-align: center;">Paracetamol (Actavis, Braun, Fr. Kabi, PanPharma)</p>				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
10 mg/ml inf. væske, inf.bag, hetteglass og ampulle		Gis uforynnet <sup>1,2</sup>  Kan også fortynnes videre <sup>1,2</sup>  <u>Fortynningsvæske<sup>2,3</sup>:</u> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml  <u>Minimums-</u> <u>konsentrasjon</u> <u>v/ fortynning<sup>1,2,13</sup>:</u> <b>1 mg/ml</b>	<u>IV infusjon<sup>1,2,40</sup>:</u> Over 15 minutter	<u>Ampuller<sup>15</sup>:</u> Engangsbruk  <u>Anbrutt inf.bag/ hetteglass<sup>2,3,15</sup>:</u> 12 timer i RT  <u>Fortynnet</u> <u>løsning<sup>2,3</sup>:</u> Bør ikke oppbevares	<b><u>Antidot<sup>2</sup>:</u></b> <b>Acetylcystein</b> <b>(Mucomyst)</b>  <b>Obs!</b> Tromboflebitt <sup>1,2,84</sup>  Kan i sjeldne tilfeller gi hypotensjon og takykardi <sup>1,2,4</sup>
Konsentrasjon: <b>10 mg/ml</b>					
<b>Tilleggsopplysninger:</b> Paracetamol = Acetaminophen <sup>1</sup> . For å unngå feilmedisinering: Ikke heng opp et større volum av legemidlet enn tilsvarende ordinert dose <sup>2</sup> . <b>Y-settforlikelige væsker<sup>2,3</sup>:</b> NaCl 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og blandinger av disse, ev. tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter.					
<b>Blandekort til barn</b>		<b>Kilder:</b> Se egen referanseliste		<b>Sist endret:</b> 01.06.19	<b>Versjon:</b> 3.0