


R06A E03	<h1 style="text-align: center;">SYKLIZIN</h1> <p style="text-align: center;">Valoid, Cyclizine Lactate (Amdipharm)</p>				
Styrke	Stamløsning	Videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
50 mg/ml inj.væske, ampulle		Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre ^{3,4,8} <u>Fortynningsvæske^{1,3}:</u> Glukose 50 mg/ml <u>Konsentrasjon ved fortykning³:</u> 3,75-7,5 mg/ml	<u>IV injeksjon^{1,8,84}:</u> Over 3-5 minutter <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon Gis fortrinnsvis i stor eller sentral vene ⁸⁴ Kan gis SC ^{1,4} Se spesiallitteratur	<u>Ampuller¹⁵:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning^{3,15}:</u> 12 timer i RT <u>Kontinuerlig infusjon^{3,15}:</u> 24 timer i RT	Obs! Tromboflebitt ^{1,8} Kan gi takykardi, hodepine, døsighet, munntørhet og insomnia ⁴ Kan i sjeldne tilfeller gi arytmier, bronkospasme og apnè ² Ekstravasasjon kan gi vevsskade ^{4,84}
Konsentrasjon: 50 mg/ml					
Tilleggsopplysninger: Y-settforlikelige væsker: Glukose 50 mg/ml ^{1,3} . NaCl 9 mg/ml kan brukes til skyll av PVK/SVK ^{4,84} .					
Blandekort til barn	Kilder: Se egen referanseliste	Sist endret: 01.07.2021	Versjon: 1.0		